

## FRACTURILE OLECRANULUI

113


113

## CARACTERISTICI

- ASEMĂNĂTOARE CU FRACTURILE DE ROTULA
- MECANISM DE PRODUCERE: DIRECT (CEL MAI FRECVENT)

114

114



Rockwood and Green's Fractures in Children, 6th ed

115

115


## CLASIFICARE

- fracturi ale părții mijlocii (cele mai frecvente)
- fracturi ale vârfului olecranului,
- fracturi bazale;
- fracturi cominutive.

116

116

## CLASIFICAREA MAYO



Rockwood and Green's Fractures in Adults, 6th ed

117

117

## SIMPTOMATOLOGIE


- COT ÎN SEMIFLEXIE, TUMEFIAT ȘI EDEMATIAT
- ECHIMOZA FĂȚĂ POSTERIOARĂ A ANTEBRĂȚULUI ȘI COTULUI
- SÂNT NEREGULAT ÎNȚRE FRAGMENTELE FRACȚURATE
- LEZAREA NERVULUI CUBITAL

118

118



119



120

## EXAMEN RADIOLOGIC

- OBLIGATORIU
- 2 INCIDENTE: FATA SI PROFIL
- OBS: DIAGN. DIFERENTIAL CU NUCLEII DE CRESTERE LA COPII SI "PATELLA CUBITI"

121


121

## TRATAMENT

- FARA DEPLASARE: ORTOPEDIC-ATELA BRAHIOPALMARA 100-110°
- CU DEPLASARE - CHIRURGICAL
  - HOBANAJ
  - CERCLAJ METALIC
  - SURUB
  - PLACA

122

122



123

123



124


124

## CLASIFICARE

- MAYO:
  - Tip I – fără deplasări;
  - Tip II – deplasări mai mari de 3 mm stabile ;
  - Tip III – deplasări instabile.

125

125



126

126

## SIMPTOMATOLOGIE

- tumefacția limitată la partea externă și superioară a antebrațului;
- echimoză tardivă;
- durere vie la palparea capului radial;
- durere vie provocată de supinație;
- crepitații osoase;
- limitarea mișcărilor de supino-pronație, în contrast cu păstrarea mișcărilor de flexie-extensie.

127

127

## TRATAMENT

- COPII - PREDOMINANT ORTOPEDIC (NU SE EXTIRPA CAPUL RADIAL)
- FARA DEPLASARE - ORTOPEDIC - IMOBILIZARE 7-14 ZILE
- CU DEPLASARE:
  - REZECTIE
  - OSTESINTEZA
  - PROTEZARE

128

128



Rockwood and Green's Fractures in Adults, 6th ed

129

129