



SINDROM ANEMIC

DATE GENERALE

- Pacient G. M. in varsta de 66 ani, din mediul rural, pensionar



MOTIVELE INTERNARII

- Epistaxis masiv bilateral
- Palpitatii
- Astenie
- Fatigabilitate



ANTECEDENTE HEREDO-COLATERALE

- Mama –hipertensiva , coronariana (IM la 40 ani), diabetica
- Tata – decedat de neoplasm de colon
- Sora – hipertensiva si diabetica



ANTECEDENTE PERSONALE PATOLOGICE

- Hipertensiune arteriala de aproximativ 3 ani
- Diabet zaharat tip II tratat cu ADO de 1 an
- Colecistectomie in urma cu 6 ani



CONDITII DE VIATA SI MUNCA

- Nu fumeaza
- Nu consuma alcool si cafea
- Locuieste la casa impreuna cu sotia; casa este bine luminata si aerisita, are 4 camere.
- In prezent pensionar



ISTORICUL BOLII

- Pacient în vârstă de 66 ani, cunoscut hipertensiv, diabetic, se prezintă acuzând epistaxis masiv bilateral, palpitații, astenie, fatigabilitate. Simptomatologia a debutat în urmă cu 3 zile. Pacientul se adresează în UPU, Clinica ORL unde i s-a practicat tamponament nazal bilateral. La prezentarea în UPU, TA=180/100mmHg.



EXAMEN OBIECTIV

- IMC=33kg/mp
- Stare generala influentata, stare de constienta pastrata
- Mucoase palide
- Tegumente palide, aspre, unghii friabile, platonikie
- Ragade la comisurile bucale, limba rosie, depapilata, uscata
- Cord in limite normale, tahicardie, TA=180/100mmHg.




EXPLORARI PARACLINICE



- G.R=2.1mil/mm³
- Hb- 5.6 g/dl
- Ht=16%
- VEM=80μ³
- Hem=19pg
- Reticulocyte=1.2%
- Sideroblasti<10%
- Fe seric=40 y%
- Trombocyte in limite normale



Anemia



Normal blood



EXPLORARI PARACLINICE

- Ex F.O: OS cataracta matura, OD: papila palida, cu emergenta centrala a vaselor retiniene, vase de aspect scleros
- EKG- tahicardie sinusala, FC=106b/min, unde T aplatizate V5-V6.
- Radiografie toracica: Cord de aspect normal
- Ecocardiografia :aspect normal
- Pacientul mai necesita de efectuat: sideremie, feritina, capacitatea totala de legare a fierului, saturatia transferinei



DIAGNOSTICE

- ANEMIE FERIPRIVA
- EPISTAXIS ANTERIOR BILATERAL TAMPONAT
- HTA STADIUL II RISC CARDIOVASCULAR FOARTE INALT
- DIABET ZAHARAT TIP II TRATAT CU ADO
- OBEZITATE GRADUL II
- CATARACTA MATURA OS

