


Leucemia Acuta

Hematopoiesis




<https://clinicalgate.com/hematopoiesis/>







> 20% Blasti



Sange normal

Leucemie



Eritrocite



Neutrofile




Limfocite



Monocyte




Trombocyte



<http://www.romedic.ro/leucemia-mieloida-cronica-lmc>
<http://www.med-health.net/Acute-Myeloid-Leukemia.html>

+ Diagnostic: CLINIC



+ Diagnostic: PARAclic

1. Citologie, imunologie - sange periferic - hemograma

- tablou sanguin
- reticulocyte
- \pm citochimie – Perox, PAS
- imunofenotipizare - citometrie in flux
- tipaj HLA – la pacient si la posibilia donatori de celule stem (frati, surori)

2. Citologie, imunologie – maduva osoasa

- aspirat medular \pm citometrie de flux
- biopsie osteo-medulara in caz de punctie alba sau neconcludenta

3. Citogenetica - cariotip – preferabil din aspirat medular

4. Biologie moleculara – se indica in general in caz de cariotip normal:

- de rutina:
 - NPM1 si FLT3 in LAM cu cariotip normal
 - BCR-ABL in cazul LAL Philadelphia pozitiva

+ Diagnostic: PARAclicnic

5. Biochimie și Hemostaza

- uzuale – ASAT/ALAT, Bilirubina, Azot, Creatinina, Glicemie - acid uric
- LDH
- ionograma (Na, K, Ca, P)
- Procalcitonina in caz de febra cu culturi negative
- TQ, APTT, Fibrinogen, PDF

6. Imagistica

- Rx/rgr torace - CT, RMN – la indicatie
- Ecocardiografie (fractie de ejectie)

6. Examen lichid cefalorahidian (in caz de LAL sau LAM4,5)


7. Bacteriologie

- hemoculturi in caz de febră
- exudat faringian, examen sputa, urocultura, coprocultura (in caz de simptomatologie sugestiva ± febra)

Hematopoiesis



<https://clinicalgate.com/hematopoiesis/>





Leucemia acută limfoblastică



Clasificarea LAL.

LAL se clasifica dupa criterii imunofenotipice

1. **LAL de linie B** (70-80% din cazuri)

- o proB – HLA-DR+, TdT+, CD19+, uneori CD34+

- o comuna – HLA-DR+, TdT+, CD19+, CD10+

- o preB – HLA-DR+, TdT+, CD19+, CD10+/-, IgM citoplasmatic (cIgM) +

(B “matur” (Burkitt) – HLA-DR+, CD19+, CD20+/-, CD10+/-, IgM de suprafata (sIgM) +)


2. **LAL de linie T** (20-30% din cazuri)

- o PreT – TdT+, CD3+, CD7+

- o T “matur” – TdT+, CD3+, CD1a/2/3+, CD5+ (11% din copii, 17% din adulti)



Clasificare WHO revizuita 2016



- **Precursor lymphoid neoplasms**
- **B lymphoblastic leukaemia/lymphoma, NOS**
- **B lymphoblastic leukaemia/lymphoma with recurrent genetic abnormalities**
- **B lymphoblastic leukaemia/lymphoma with t(9;22)(q34;q11.2); BCR-ABL1**
- **B lymphoblastic leukaemia/lymphoma with t(v;11q23); MLL rearranged**
- **B lymphoblastic leukaemia/lymphoma with t(12;21)(p13;q22); TEL-AML1 (ETV6-RUNX1)**
- **B lymphoblastic leukaemia/lymphoma with hyperdiploidy**
- **B lymphoblastic leukaemia/lymphoma with hypodiploidy (Hypodiploid ALL)**
- **B lymphoblastic leukaemia/lymphoma with t(5;14)(q31;q32); IL3-IGH**
- **B lymphoblastic leukaemia/lymphoma with t(1;19) (q23;p13.3); E2A-PBX1(TCF3-PBX1)**
- **T lymphoblastic leukaemia/lymphoma**

+ Caracteristici

LAL B

- Modificari citogenetice:
 - T (9;22) – cromozom Philadelphia
 - T (4,11)
 - prognostic nefavorabil
 - T (12;21)
 - Prognostic favorabil

LAL T

Lf T – Timus – Tineri

- CD 10 – negativ, asociaza un prognostic negativ

Se poate prezenta ca o masa mediastinala (timus);



Tratament

■ **Tratament suportiv și măsuri generale**

■ TRANSFUZII

- masa eritrocitara : indicate la $Hgb < 8g/dl$
- masa trombocitara : indicate la $Tr < 10.000/mm^3$

■ ANTIBIOTERAPIE

■ FACTORI DE CREȘTERE

■ **Chimioterapie**

■ prima linie


- Protocol Hoelzer adaptat
- Protocol HyperCVAD

■ LAL recidive

- Protocele “de salvare”:
 - asocieri cu Metotrexat “high-dose”
 - High dose Ara-C + mitoxantrona

■ LAL-Philadelphia (BCR-ABL) pozitive – se asociază TKI (Inhibitor de tirozin kinaza): imatinib, nilotinib etc.

■ **Transplant allogen de celule stem**




LAL – Criterii de remisiune completa

- Pacient **asimptomatic**
 - **Fara adenopatii/organomegalii**
 - Neutrofile > 1500/mm³
Trombocite > 100.000/mm³
Hgb > 10g/dl
 - **Fara blasti** in sangele periferic
 - **Blasti medulari <5%**; daca intre acesti 5% exista blasti cu caractere morfologice sau citochimice de limfoblasti, nu este
- + remisiune completa
- **Fara anomalii citogenetice**


Hematopoiesis



<https://clinicalgate.com/hematopoiesis/>



+ Date epidemiologice





Rată supraviețuire
la 5 ani

27.4%

Vârsta medie:

68 ani

Leucemia acută mieloblastică



<http://www.med-health.net/Acute-Myeloid-Leukemia.html>

<http://cursoenarm.net/UPTODATE/contents/mobile/leukemia.htm?17/25/17819>



Diagnostic:

1. Teste obligatorii la diagnostic

- Hemoleucograma cu frotiu de sange periferic
- Aspirat medular
- BOM
- Imunofenotipare
- Istoric medical/APP/Comorbidități
- Antecedente familiale
- Antecedente de sangerare
- Status de performanță ECOG/WHO score
- Biochimie, teste de coagulare, sumar urina, testare virala (hepatita A,B,C, HIV)

2. Analiza genetică

- citogenetică - cariotip
- **Mutații genetice: NPM1, CEBPA, RUNX1, FLT3, TP53, ASXL1**
- Rearanjamente genetice: PML-RARA, CBFB-MYH11, RUNX1-RUNX1T1, BCR-ABL1, alte gene de fuziune
- test de sarcină cu informare despre crioprezervarea ovocitelor sau a spermatozoizilor
- Rx-grafie pulmonară, EKG, ECHOcardiac
- Tipizare HLA – cautarea unui donator eligibil
- Puncție lombara- examen lichid cefalorahidian

Döhner H. Et al. Blood. 2017 Jan 26; 129(4): 424–447. (European LeukemiaNet (ELN) recommendations for diagnosis and management of acute myeloid leukemia (AML) in adults)

3. Teste/Proceduri adiționale

+ Clasificarea FAB a LAM (imunofenotipare)

□ **M0** = citologic **neidentificabilă**; apartenența de linia mieloidă poate fi stabilită doar la analiza imunofenotipică

□ **M1** = **mieloblastica fara diferentiere**

□ **M2** = mieloblastica **cu diferentiere**

□ **M3** = **promielocitara**

□ **M4** = **mielomonoblastica**: componenta monocitara (monoblasti monocite) >20% în maduva.

□ **M5** = **monoblastica**: componenta

monocitara >80%

M5a = monoblastica **fara diferentiere**: monoblasti >80% din componenta monocitara


M5b = monoblastic **cu diferentiere**: monoblasti <80% din componenta monocitara





Mutația genei PML/RAR α LA Promielocitară

- Prezența t (15;17)
- Caracteristici
 - proces de hiperfibrinoliză și/sau un sindrom de coagulare intravasculară diseminată (CID)
 - Începerea promptă a tratamentului cu ATRA
- Sindromul de diferențiere (SD) cunoscut și sub numele de sindrom ATRA
 - detresă respiratorie acută, cu dispnee, tuse, infiltrate pulmonare micronodulare, pleurezie






Clasificare din punct de vedere a citogeneticii/biologiei moleculare

- Mutatii ale genelor NPM1 – prognostic favorabil
- Mutatii ale genelor FLT3 – prognostic nefavorabil

FLT3 Mutations in AML



- Confer a poor prognosis
- *FLT3* ITD mutations
 - Found in ~30% of cytogenetically normal AML
 - Leads to constitutive activation of FLT3 receptor
- Multiple agents targeting *FLT3* mutations



Clasificare WHO revizuită 2016

Acute myeloid leukemia (AML) and related neoplasms

AML with recurrent genetic abnormalities

AML with t(8;21)(q22;q22.1);*RUNX1-RUNX1T1*

AML with inv(16)(p13.1q22) or t(16;16)(p13.1;q22);*CBFB-MYH11*

APL with *PML-RARA*

AML with t(9;11)(p21.3;q23.3);*MLLT3-KMT2A*

AML with t(6;9)(p23;q34.1);*DEK-NUP214*

AML with inv(3)(q21.3q26.2) or t(3;3)(q21.3;q26.2); *GATA2, MECOM*

AML (megakaryoblastic) with t(1;22)(p13.3;q13.3);*RBM15-MKL1*

Provisional entity: AML with *BCR-ABL1*

AML with mutated *NPM1*

AML with biallelic mutations of *CEBPA*

Provisional entity: AML with mutated *RUNX1*

AML with myelodysplasia-related changes

Therapy-related myeloid neoplasms

AML, NOS

AML with minimal differentiation

AML without maturation

AML with maturation

Acute myelomonocytic leukemia

Acute monoblastic/monocytic leukemia


Pure erythroid leukemia

Acute megakaryoblastic leukemia

Acute basophilic leukemia

Acute panmyelosis with myelofibrosis

+ Mutațiile FLT3




- Mutațiile FLT3 de sine stătătoare induc mieloproliferare
- Mutațiile FLT3 împreună cu alte modificări paralele induc LAM
 - FLT3-ITD + fuziunea PML-RARA
 - FLT3-ITD + MLL-PTD
 - FLT3-ITD + mutația CEBPA

Patel JP et al, N Engl J Med 2012; 366:1079-1089

Gilliland DG et al, Curr Opin Hematol. 2002 Jul;9(4):274-81.





Complexitatea mutatiilor în LAM



Gene	Overall Frequency (%)
FLT3 (ITD, TKD)	37 (30, 7)
NPM1	29
DNMT3A	23
NRAS	10
CEBPA	9
TET2	8
WT1	8
IDH2	8
IDH1	7
KIT	6
RUNX1	5
MLL-PTD	5
ASXL1	3
PHF6	3
KRAS	2
PTEN	2
TP53	2
HRAS	0
EZH2	0



Mutația FLT3




- tipuri de mutații FLT3
- ITD – 20%-30%
 - Blochează funcția autoinhibitorie a regiunii juxtamembranare
- TKD – mutații punctiforme 5%-10%
 - Activează direct domeniul TK și receptorul FLT3
- Rezultă în ACTIVAREA NECONTROLATĂ A RECEPTORULUI prin
 - Dimerizarea receptorului în absența ligandului
 - Semnalizare directă

+ FLT3 receptor, ligand și semnalizare

Receptorul FLT3

- Receptor tirozin-kinazic cls III
- Alți reprezentanți: **c-KIT, PDGF-bR**
- în general în **celula stem hematopoietică** din MO, însă **NU în celulele diferențiate**
- **Inactiv - LIGAND-Activ**
- **3 căi de semnalizare**
- Joacă un rol cheie în **controlul hematopoiezei**




Original artwork by Mohammad A. Rattu, PharmD. Source: References 7, 8.

Figure 1. Schematic representation of the FMS-like tyrosine kinase 3 (FLT3) enzyme and downstream signaling pathways.




FLT3 ITD vs TKD




FLT3-ITD	FLT3-TKD
<ul style="list-style-type: none">• Se prezinta adesea cu număr mare de blasti și cariotip normal• Răspuns inițial la tratament dar cu rată de recidivă mare si cu rata mica de supraviețuire• instabilitate genomică• HSCT este de preferat la pacientii in remisiune	<ul style="list-style-type: none">• Nu se asociază cu leucocitoză• Nu impacteaza în aceeași măsură raspunsul la tratament <p>Poate fi datorata diferențelor de activare a cailor de semnalizare.</p>

+ Detecția mutației



PCR



Electroforeză
capilară

+ Allelic ratio

- Este practic o varianta de a analiza **subclonalitatea** probei de ADN pe care o analizăm
- ! **NU** este un procent %
- Raportul dintre forma mutantă ITD/wild-type (non-mutantă)

Exemplu

WT – 0,55


ITD – 0,45

$$AR=0,45/0,55= 0,8$$


Consens: AR scăzut <0.5 respectiv AR înalt ≥ 0.5

IMPORTANT – nu este o metoda standardizată

+ PCR – allelic ratio



+ PCR – allelic ratio



+ Stratificarea riscului

Favorable	Intermediate	Adverse
<p>t(8;21)(q22;q22.1); RUNX1-RUNX1T1</p> <p>inv(16)(p13.1q22) or t(16;16)(p13.1;q22); CBF-MYH11</p> <p>Mutated NPM1 without FLT3-ITD or with FLT3-ITD_{low}AR</p> <p>Biallelic mutated CEBPA</p>	<p>Mutated NPM1 and FLT3-ITD_{high}AR</p> <p>Wild-type NPM1 without FLT3-ITD or with FLT3-ITD_{low}AR (without adverse-risk genetic lesions)</p> <p>t(9;11)(p21.3;q23.3); MLLT3-KMT2A†</p> <p>Cytogenetic abnormalities not classified as favorable or adverse</p>	<p>t(6;9)(p23;q34.1); DEK-NUP214</p> <p>t(v;11q23.3); KMT2A rearranged</p> <p>t(9;22)(q34.1;q11.2); BCR-ABL1</p> <p>inv(3)(q21.3q26.2) or t(3;3)(q21.3;q26.2); GATA2,MECOM(EVI1)</p> <p>−5 or del(5q); −7; −17/abn(17p)</p> <p>Complex karyotype, monosomal karyotype</p> <p>Wild-type NPM1 and FLT3-ITD_{high}AR</p> <p>Mutated RUNX1</p> <p>Mutated ASXL1</p> <p>Mutated TP53</p>

+ Inhibitori FLT3

Tip	Activitate	Generația I	Generația II
		Fără specificitate FLT3	Mai specific
TIP I	Se leaga de situsul de legare ATP cand receptorul este ACTIV Celule ITD si TKD pozitive	Sunitinib Lestaurtinib Midostaurin	Gilteritinib Crenolanib
TIP II	Interactioneaza cu regiunea adiacenta situsului de legare ATP, accesibila doar in cazul in care receptorul este INACTIV; previne activare RECEPTORULUI Celule ITD pozitive *(Mutatiile TKD favorizeaza conformatia ACTIVA a receptorului)	Sorafenib Tandutinib Ponatinib	Quizartinib

+ Potență si selectivitate



Inhibitori FLT3	Midostaurin	Sorafenib	Quizartinib	Gilteritinib
Tip/Generație	Tip I, gen I	Tip II , gen I	Tip II, gen II	Tip I, gen II
Inhibă FLT3	ITD + TKD	ITD	ITD	ITD + TKD
Alte ținte	PKC, Syk, Flk-1, Akt, PKA, KIT, Fgr, Src, PDGFR β , VEGFR1, VEGFR2	RAF, VEGFR1,2,3, PDGFR β , KIT, RET	KIT, PDGFR β RET	LTK, ALK, AXL

Important

FLT3 este cea mai des întâlnită mutație în LAM



Are un impact asupra prognosticului și a deciziei terapeutice prin introducerea unui inhibitor FLT3

Se impune necesitatea unei testări genetice cât mai rapidă



Tratament

■ Terapiile noi

■ Inhibitorii FLT3

■ Tratament suportiv și măsuri generale

■ TRANSFUZII

- masa eritrocitară : indicate la Hgb<8g/dl
- masa trombocitară : indicate la Tr<10.000/mmc

■ ANTIBIOTERAPIE

■ FACTORI DE CREȘTERE

■ Chimioterapie

■ Inductie

- “3+7”


■ Consolidare

- HDAC X 4

Pacienti LAM refractari sau in resuta


FLAG, FLAG-IDA, MEC, S-HAM



■ Transplant allogen de celule stem



LAM – Criterii de remisiune completa

- Pacient **asimptomatic**
- **Fara adenopatii/organomegalii**
- Neutrofile > 1500/mmc
Trombocite > 100.000/mmc
Hgb > 10g/dl
- **Fara blasti** in sangele periferic
- + - **Blasti medulari <5%**;
- **Fara anomalii citogenetice**





Prezentare de caz



NUME: C.V.

VARSTA: 72 ANI

SEX: masculin

APP: Comorbidități
cardiovasculare

Prima prezentare

26.10.2017 - UPU SCMUT

- fatigabilitate marcata, transpiratii nocturne, astenie marcata ,paloare sclero-tegumentara.
- Leucocitoză 50 330 /mmc
- Hb – 10.4 g/dl
- Frotiu periferic – 86% blasti, numerosi cu bastonașe Auer
- AM – 96% blasti
- IMUNOFENOTIP – LAM M1 (fara maturatie)

HEMATOLOGIE

Analizele validate de: Dr. Rodica Pacurar

Test	Rezultat	Interv. biol. de ref./uni
Leucocite (WBC)	50.33	4 - 10 / *10 ³ /μL
Eritrocite (RBC)	3.13	4.5 - 5.5 / *100 ³ /μL
Hemoglobina (HGB)	10.4	13 - 17 / g/dL
Hematocrit (HCT)	32.1	40 - 50 / %
VEM (MCV)	102.6	80 - 100 / fL
HEM (MCH)	33.2	27 - 32 / pg
CHEM (MCHC)	32.4	31.5 - 34.5 / g/dL
RDW-SD	69.1	39 - 46 / fL
RDW-CV	18.6	11.6 - 14 / fL
Trombocite (PLT)	287	150 - 410 / *10 ³ /μL

Formula Leucocitara Manuala

analizele validate de: Dr. Rodica Pacurar

Test	Rezultat	Interv. biol. de ref./uni
Segmentate neutrofile	6	40 - 80 / %
Limfocite mici	7	20 - 40 / %
Blasti	86	0 - 0 / %

Morfologie

Morfologie eritrocitara

anizomacrocitoza	Valori normale normocitoza, normocromie
------------------	---

Morfologie leucocitara

prezenti numerosi blasti cu bastonase Auer	Valori normale
--	----------------

Morfologie trombocitara

anizocitoza, macrotrombocite	Valori normale
------------------------------	----------------

Teste de hemostaza

analizele validate de: Dr. Elena Doina Nicola

Test	Rezultat	Interv. biol. de ref./uni
PT (sec)	11.8	9.4 - 12.5 / sec
INR	1.09	/ INR
AP (%)	96.0	/ %
APTT (sec)	29.5	25.4 - 36.9 / sec
D-D	2731	0 - 243 / ng/ml
FIB	372	238 - 498 / mg/dL

Prima prezentare

26.20.2017 - UPU SCMUT

- fatigabilitate marcata,
- transpiratii nocturne
- Astenie marcata
- paloare sclero-tegmentara.

BIOCHIMIE S

analizele validate de: Velimir Erdelean

Test	Rezultat	Interv. biol. de ref./uni
ALAT	19	2 - 41 / U/L
ASAT	24	2 - 40 / U/L
GLICEMIE	128	82 - 115 / mg/dl
CREATININA	1.32	0.70 - 1.20 / mg/dl
UREE	43	17 - 49 / mg/dl

Aspirat medular coxal Medulograma

Diagnostic de trimitere: LA

Date clinice / paraclinice semnificative: neprecizate

Hemoleucograma din data de: 26.10.2017

Leucocite: $50.33 \times 10^3/\mu\text{L}$ **Trombocite:** $287 \times 10^3/\mu\text{L}$ **Eritrocite:** $3.13 \times 10^6/\mu\text{L}$

Hb: 10.4g/dL **VEM:** 102.6fL **CHEM:** 32.4g/dL **HEM:** 33.2pg

Formula leucocitara: ne 6, li 7, blasti 86 unii cu bastonase Auer

Aspirat efectuat din os de consistenta normala

Probe examine: frotiuri medulare cu celularitate marcat crescuta; grunji striviti absenti

Celule numarate: 100

Seria eritroida: 1/1000

Seria granulocitara: 3%


Seria megacariocitara: nu se observa elemente

Limfocite: 1%

Hemoblasti: 96%, unii cu bastonase Auer

Coloratie Perls: neinterpretabil

CONCLUZIE: Aspect de LA mieloida; se recomanda imunofenotipare



+ Imunofenotip si Citogenetica

CITOMETRIE IN FLUX



Nr	6799	Data	10/31/2017
Nume pacient			
Varsta			
Proba			
Provenienta	Spitalul Municipal Timisoara - Prof. Ionita		
Diagnostic trimiterii	Leucemie acuta		
Numar leucocite (WBC / mm3)			
Limfocite (% din toate celulele)			
Granulocite (% dtc)			
Monocite (% dtc)			
Eozinofile (% dtc)			
Bazofile (% dtc)			
Limfocite B (% din ly)			
Limfocite T (% din ly)			
Celule NK (% din ly)			
Diagnostic	achizitie = 100.000 evenimente. SSc/CD45: Blasti = 61%dtc cu urmatorulimunofenotip: CD45dim+ CD34+ cyMPO+ CD117+ HLA/DR+ CD33+ CD15+ CD7+; markeri neexprimati de populatia blastica: cyCD3,cyCD79a,CD19,CD7,smCD3,CD16,CD13,CD16,CD10,CD64,IREM2, CD14,NG2,CD4. Leucemie acuta mieloida fara maturatie.		

Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu"
Clinica de Oncohematologie
Laboratorul de Genetica

CNP:1450401354767
Motivul trimiterii: LA
Material biologic: maduva hematogena
Trimis de: Conf.Dr.Ionita

S-a efectuat metoda indirecta de studiu a cromozomilor umani. Materialul biologic a fost prelucrat corespunzator iar pentru evidentiarea cromozomilor s-a folosit tehnica de bandare GTG(450 benzi). Nu au fost obtinuti cromozomi metafazici.


Data
13.11.2017

SL. Dr. Popa Cristina
Medic Primar Genetica Medicala

S.L. Dr. POPA CRISTINA
Medic Primar Genetica Medicala
Doctor in Stiinta Medicala
Cod. D. 1450401354767



Initiere tratament si evolutie




- **7.11.2017** inductie “3+7”
- **medicatie adjuvanta:** antibioterapie, antimicotic (Fluconazol), bicarbonat de sodiu, protectoare hepatice, antiemetice, analgezice si substitutie cu masa eritrocitara si trombocitara.
- Post chimioterapie
 - - **neutropenie febrila** pentru care se initiaza tratament cu factor de stimulare a cresterii coloniilor granulocitare,
 - **epistaxis** nara stanga pe fond de trombocitopenie severa
- **12.11.2017** s-a decelat **proces inflamator** supurativ la nivelul locului de implantare a unui cateter central
- **14.11.17 :Leucocite (WBC)=* 0.35 *10³/μL** , Eritrocite (RBC)=* 2.66 *10³/μL , Hemoglobina (HGB)=* 8.4 g/dL Trombocite (PLT)=* 10 *10³/μL , **Neutrofile #=* 0.10 *10³/μL**
- **21.11.17 :Leucocite (WBC)=* 0.41 *10³/μL** , Eritrocite (RBC)=* 2.80 *10³/μL , Hemoglobina (HGB)=* 8.4 g/dL , Trombocite (PLT)=* 5 *10³/μL, **Neutrofile #=* 0.01 *10³/μL**

+ Evolutie

- **06.12.17 : Leucocite (WBC)=* 0.41**
103/ μ L, Eritrocite (RBC)= 2.96
1003/ μ L , Hemoglobina (HGB)= 8.8
g/dL , Trombocite (PLT)=* 5 *103/ μ L,
Neutrofile #=* 0.19 *103/ μ L
- **15.12.17 : Leucocite (WBC)=* 2.00**
103/ μ L , Eritrocite (RBC)= 2.97
1003/ μ L , Hemoglobina (HGB)= 8.6
g/dL , Trombocite (PLT)=* 33 *103/ μ L ,
Neutrofile #=* 1.15 *103/ μ L
- 18.12.2017 **Leucocite (WBC)=* 1.54**
103/ μ L , Eritrocite (RBC)= 2.89
1003/ μ L , Hemoglobina (HGB)= 8.5
g/dL , Trombocite (PLT)=* 47 *103/ μ L ,
Neutrofile#=* 0.90 *103/ μ L
- **20.12.2017, Aspirat Medular Coxal=**
CONCLUZIE: Hemoblasti 14.5% din
celularitatea medulara (post
chimioterapie).
Dismegacariopoeiza.

- Incepanand cu data de **06.12.2017** tabloul hematologic al pacientului incepe sa se amelioreze treptat. Din data de **09.12.2017** se opreste administrarea de factori de crestere care insa se reia din data de 18.12.2017 pana in **21.12.2017** cand pacientul este externat .
- **21.12.17 : Leucocite (WBC)=***
3.66 *103/ μ L , Eritrocite (RBC)=*
3.35 *1003/ μ L , Hemoglobina
(HGB)=* 9.7 g/dL **Trombocite**
(PLT)=* 57 *103/ μ L Neutrofile
#=*2.93 *103/ μ L ,
- APTT (sec)=29.2 sec , **D-D=* 1115 ng/ml** , PT (sec)=* 13.9 sec ,
INR=1.28 INR , AP (%)=74.0 %
- ACID URIC=4.4 mg/dl ,
Blasti=1/100 % , GLICEMIE=88
mg/dl , UREE=* 51 mg/dl ,
CREATININA=1.07 mg/dl ,
ALAT=35 U/L , ASAT=12 U/L ,
BILIRUBINA DIRECTA=* 0.64
mg/dl , BILIRUBINA TOTALA=0.91
mg/dl , POTASIU=4.4 mmol/l ,
SODIU=139 mmol/l






- Testare genetică:
 - Mutatiile FLT3 ITD - pozitiv;
 - $\text{RATIO FLT3 MUTANT/WILD-TYPE} = 0.66$
 - Mutațiile NPM1 – NEGATIV
 - Fuziunile genice - NEGATIV
- AM 28.01.2018 – 80%
- Din data de **29.01.2018** incepe terapia cu Inhibitorul de FLT3 (Gilteritinib)
- AM 19.02.2018 – 25% blasti
- 22.02.2018 Pneumonie fungică – Voriconazol
- 15.03.2018 – hemoragie retineana dreapta
 - Se decide intreruperea tratamentului
- AM 18.03.2018 – 5%
- 1.04.2018 – starea se agravează
 - Hiperleucocitoza
 - Insuficienta multipla de organ
- 07.04.2018 – Pacientului decedeaza
 - Posibil datorata hematopoiezei extramedulare excesive



Va multumesc!



The Hebrew University and Hadassah Medical Center in the joint Ein Kerem campus at Jerusalem