

O. F., 35 ani,
profesor, Timișoara





Istoricul medical

- *Antecedente personale:*

1. ultimul consult medical: martie 2020

2. istoric alergii: sensibilitate la medicamentele Algocalmin și Nurofen

- *Antecedente heredo- colaterale: nesemnificative*

- *Factorii de risc asociați*

- ❑ bacteriile patogene și depozitele microbiene dentare

- ❑ determinanți de risc/ fond: vârsta prin debut precoce al pierderilor dentare și sexul masculin

- ❑ indicatori de risc: controale stomatologice sporadice 2017, 2019

- ❑ markeri de risc/ predictorii : sângerare la sondaj

Factori etiologici locali (Rusu, Onisei, 2015)

1. Factori iritativi: Factor determinant- PLACA BACTERIANĂ

a. Factori predispozanți: Tartrul supra și subgingival;

b. Factori iatrogenici: contacte proximale deschise consecutiv edentațiilor neprotezate, cariile secundare și obturații debordante, coroane neadaptate marginal, lucrări protetice fixe retentive, adaptate incorect, care suprasolicită parodonțiul

c. Obiceiuri și traumatisme autoinduse: **piercing labial**

2. Factori funcționali: edentația, disfuncția ocluzală

Istoricul dentar

- motivele prezentării : 1.7, 2.7 zone impact alimentar, mobilitatea lucrărilor protetice în cadranul II
- controale stomatologice
 - ultima vizită: 2017, 2019
 - frecvența și natura tratamentelor: în scop protetic
- date legate de igiena orală
 - frecvența: 2x
 - momentul zilei: dimineața și seara
 - metodă: periuța electrică
 - mijloace suplimentare pentru IO: duș bucal folosit cu întrerupere
- dureri gingivale sau la nivelul dinților asociate cu arii de impact alimentar 1.7 D, 2.7 D


Istoricul dentar

- obiceiuri
 - bruxism
 - piercing labial: a renunțat în decembrie 2019
- probleme parodontale
 - natura: pierderi de atașament asociate cu prezența lucrărilor protetice fixe, retracții gingivale parțial cauzate de piercing-ul labial
 - tratamente parodontale: debut terapie inițială - decembrie 2019; terapie chirurgicală pentru- martie 2020


Examenul clinic

- **Examinarea extraorală:** examinarea nodulilor limfatici - fără modificări patologice
- **Examinarea orală**
 - Igiena: nesatisfăcătoare la ultima prezentare în februarie 2020
 - Examinarea dinților prezenți
 - Pierderi de țesut dur (**abrazii**, atriții, eroziuni): 1.3-2.2; 3.3-4.3; 3.7
 - Contactelor interproximale deschise: corespund edentațiilor 3.6, 4.6;
 - Prezența factorilor de microiritație: restaurări protetice fixe în cadranul I și II
 - Mobilitate dentară: gd I 2.7;
 - Poziția de intercuspidare maximă: contacte multiple și simultane prezente, acoperire în plan frontal ½

Examinarea parodonțiului



Val. med. a adâncimii la sondare = 2.3 mm Val. med. a nivel. de atasament = -2.5 mm 12 % Placă 32 % Sângerare la sondare




Examen radiografic




Evoluție

Terapia inițială parodontală



Oprea Florin 06.03.1985

Evoluție



Recesii gingivale

Decembrie 2019

RT2: **V** 1.8, 3.5, 3.4, 3.3, 3.2, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4; **L** 3.4, 3.3, 3.2, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4
(18)

RT3: **V** 4.7,4.5; **L** 3.5, 4.5; (4)


Februarie 2020

RT2: **V** 1.1, 2.2, 2.3, 4.4, 4.2, 4.1, 3.1 **L** 4.3, 4.2,3.1, 3.2, 3.3, 3.5 (13)



RT3: **V** 4.7, 4.3,3.3, 3.5, 3.7 **L** 3.5, 3.7 (6)

Afectarea furcațiilor

Evoluție dec 2019- feb 2020: afectare furcă




Terapie chirurgicală parodontală, la 2 luni după TI



OPREA FLORIN
DOB: 06/03/1985
Created: 17/09/2019 1:23:09 PM
18, 17
Physical Width: 4.014 cm



OPREA FLORIN
DOB: 06/03/1985
Created: 17/09/2019 1:23:09 PM
18, 17
Physical Width: 4.014 cm



OPREA FLORIN
DOB: 06/03/1985
Created: 05/12/2019 11:38:31 AM
17, 16
Physical Width: 4.014 cm



OPREA FLORIN
DOB: 06/03/1985
Created: 05/12/2019 11:38:31 AM
17, 16
Physical Width: 4.014 cm



OPREA FLORIN
DOB: 06/03/1985
Created: 02/03/2020 6:49:37 PM
17
Physical Width: 3.999 cm



OPREA FLORIN
DOB: 06/03/1985
Created: 02/03/2020 6:49:37 PM
17
Physical Width: 3.999 cm





Diagnosticul de certitudine

Parodontită cronică severă localizată 12.12%

Parodontită Stadiu IV Grad C generalizată 36.36%

- Pierdere de atașament mai mare sau egală cu 5 mm
- RBL 60%
- RBL/age 1.76

Plan de tratament

1. Terapia inițială:

- Îndepărtarea factorilor de microiritație prin: tratarea leziunilor carioase primare și secundare, ablația lucrărilor protetice fixe din cadranele 1 și 2, înlocuirea obturațiilor debordante și confecționarea unei gutiere pentru managementul bruxismului;
- Igienizare profesională prin detartraj ultrasonic și periaj dentar;
- Instrucțiuni cu privire la o igiena orală personalizată adecvată și renunțarea la piercing-ul labial (factor local iritativ);
- Evaluare parodontală;
- OSFMD;
- Reevaluarea statusului parodontal și controlului plăcii

1. Terapia corectoare:

- Chirurgie parodontală rezectivă pentru reducerea pungilor parodontale reziduale și managementul afectării furcale
- Tratament restaurator definitiv: PRF fixe în cadranele 1, 2, 3, 4, reabilitare ocluzală complexă

1. Terapia de mentinere:

- Reevaluarea controlului plăcii;
- Instrucțiuni pentru igienă orală personalizată;
- Reevaluare parodontală;
- Igienizare profesională prin detartraj ultrasonic supra- și subgingival și periaj dentar;
- Examen radiografic la 6 luni după terapia inițială și chirurgicală

Prognostic provizoriu

Prognostic nefavorabil: pierdere osoasă avansată, mobilitate dentară, furcație de gradul I și III, cooperarea nesatisfăcătoare în privința menținerii unei igiene corespunzătoare.

Questionable prognosis: >50% attachment loss, poor crown-to-root ratio, poor root form, grade II furcation invasion (location and depth make access difficult) or grade III furcation invasion; mobility no. 2 or no. 3; root proximity. (Carranza, 13th Ed.)