


REABILITAREA ORALA A EDENTATULUI TOTAL




REABILITAREA COMPONENTEI DURE A CAMPULUI PROTETIC EDENTAT TOTAL

- IN MOMENTUL EXTRACTIILOR
- PENTRU STRUCTURILE DURE IN EXCES
- PENTRU STRUCTURILE DURE AFLATE
IN PROCESE CRONICE INVOLUTIVE





REABILITAREA COMPONENTEI DURE A CAMPULUI PROTETIC EDENTAT TOTAL



STRUCTURI IN EXCES: exostoze, torus-uri, retentivitati exagerate ale crestelor alveolare sau tuberozitatilor maxilare

STRUCTURI IN MINUS: in general - crestele alveolare si bolta palatina

REABILITAREA TARDIVA A COMPONENTEI DURE A CAMPULUI PROTETIC EDENTAT TOTAL



CAUZE: SISTEMICE SAU LOCALE

TRATAMENT

- TEHNICI CHIRURGICALE DE AUGMENTARE
- UTILIZAREA ADEZIVILOR
- CAPTUSIREA PROTEZELOR



REABILITAREA COMPONENTEI MOI A CAMPULUI PROTETIC EDENTAT TOTAL

Se realizeaza :

- INAINTE de protezare
- IMEDIAT dupa protezare
- TARDIV dupa actiunea indelungata a protezelor


-Poate fi:

- SEGMENTARA (formatiunile mobile de la periferia frenul buzei superioare
- ZONALA (crestele balante)
- PE TOATA SUPRAFATA DE SPRIJIN – stomatopatiile



campului protetic ex:

protetice



Notes: (a) Plaster model of maxillary edentulous jaw; (b) plaster model of edentulous mandible



Semne subiective frecvente legate de protezarea totala



Durere
Solutie de continuitate
Arsura, usturime
Greata
voma



REABILITAREA COMPONENTEI MOI A CAMPULUI PROTETIC EDENTAT TOTAL



Atitudinea fata de durere, leziune de mucoasa, eroziune:
Identificare – marcarea
Slefuire proteza
Echilibrare ocluzala

REABILITAREA TARDIVA a COMPONENTEI MOI A CAMPULUI PROTETIC EDENTAT TOTAL


Criterii de clasificare:

Topografice: localizate, difuze, generalizate


Morfopatologice:
eritematocongestive, ulcerative,
proliferative, hiperacantozice,
papilomatoase, pseudotumorale,
atrofice

Etiologice: microbiene, virale sau
levurice

Evolutive: acute sau cronice



REABILITAREA ZONALA a COMPONENTEI MOI A CAMPULUI PROTETIC EDENTAT TOTAL



Creasta balanta este localizata preponderent in zona frontala maxilara sau mandibulara.

Exista 2 modalitati de abordare:

- una chirurgicala
- una protetica - foliere zona

REABILITAREA TARDIVA a COMPONENTEI MOI A CAMPULUI PROTETIC EDENTAT TOTAL -

Etiologie:

Factori generali – tulburari hormonale, avitaminoze, boli metabolice si de nutritie, afectiuni cardio-vasculare, perturbari vaso-motorii, afectiuni debilitante cu depresii imunitare

Factorii locali: mecanici-traumatici, chimio-toxici, alergici, microbieni si levurici, factori de dezechilibru imunitar dati de schimbarea compozitiei chimice, biologice a salivei, de fragilitatea capilara, gradul de descuamare celulara si de cheratinizare a mucoasei





Fig. 6



Tratamente specifice edentatului total protezat




1. Profilactic – igiena orală corectă
2. Curativ
 - a. suprimarea temporară a protezelor
 - b. igienizarea cavității bucale și a protezelor
 - c. tratament local
 - d. rareori tratament general

Reabilitarea orala a functiei masticatorii la edentatul total protezat

RESTABILIREA FUNCTIEI MASTICATORII:

1. inlaturarea leziunilor mucoasei
2. reeducarea functiei masticatorii



Masticatia edentatului total protezat are anumite caracteristici speciale:

- nu se poate face incizia alimentelor
- Masticatia trebuie sa aiba un stereotip de tocator si sa distribuie alimentul bilateral simultan

Reabilitarea orala a functiei masticatorii la edentatul total protezat

STABILITATEA PROTEZELOR TOTALE

- aspectul campului protetic – retentivitati
- inaltimea bazelor protezelor
- presiunile ocluzale distribuite uniform pe campul protetic
- extinderea bazelor protetice



Reabilitarea orala a functiei masticatorii la edentatul total protezat

STABILITATEA PROTEZELOR TOTALE

- extinderea bazelor protetice
- montarea dintilor artificiali in functie de latimea crestelor alveolare, de planul de orientare ocluzala, respectand curbele de compensatie
- Contacte dento-dentare optime – ocluzie functionala



CORECTAREA DIZARMONIILOR OCLUZALE

HARTIE DE ARTICULATIE

CEARA DE OCLUZIE


PASTELE ABRAZIVE

DISPOZITIVUL CU SPRIJIN CENTRAL “Coble”

Remodelare ocluzala pe articulator

Remodelare primara

Remodelare secundara



REABILITAREA FUNCTIEI FONETICE LA EDENTATUL TOTAL PROTEZAT

- Fonatia se schimba datorita modificarilor de forma, calibru ale cutiei de rezonanta - cavitatea bucala si datorita interferentelor cu primul segment al faringelui
- Modificari ale pozitiei mandibulei
- Restrictii pentru limba
- Tonusul muschilor periprotetici vestibulari



REABILITAREA FUNCTIEI FONETICE LA EDENTATUL TOTAL PROTEZAT

VOCALE


- Pe directia de ridicare a limbii
vocale anterioare, palatale: I, E
vocale mediale: Î, A, E
vocale posterioare: O, U
- Vocale inchise intre fata dorsala a limbii si bolta
palatina: I, Î, U; vocale mijlocii: E, Ă, O
vocale deschise: A.



REABILITAREA FUNCTIEI FONETICE LA EDENTATUL TOTAL PROTEZAT



CONSOANE

- Dupa modul de articulare:
 - ocluzive sau explozive (P,B,T,D,K,G)
 - Constrictive si fricative: (F,V,S,Z,J,H)
 - Semiocluzive (Ci,Ge)
- Dupa locul de realizare a constrictiei sau ocluziei:
 - Bilabiale (P,B,M)
 - Labio-dentale (V,F)
 - Dentoalveolare (T,D,N,S,Y,L,T,Ț,R)
 - Prepalatale (S,J,Ci,Ge)
 - Palatale (K,G)
 - Laringeale (H)
- Dupa intensitatea tensiunii musculare care insoteste formarea consoanelor:
 - Cu tensiune musculara puternica (P,T,C,S,F)
 - Cu intensitate articulatorie mica (B,D,G,J,Z,V)



REABILITAREA FUNCTIEI FONETICE LA EDENTATUL TOTAL PROTEZAT

- MONTAREA UNOR DINTI ANATOFORMI CU SUPRAFETE PALATINALE SIMILARE CELOR NATURALI
- RUGI PALATINE, PAPILA INCISIVA
- PRONUNTIA SIFLANTELOR – RECUPERARE 2-3 ZILE
- PRONUNTIA LABIALELOR




REABILITAREA FUNCTIEI FONETICE LA EDENTATUL TOTAL PROTEZAT



METODA PIEZOGRAFICA DE AMPRENTARE FONETICA

FONEME TEST:

LINGUO – PALATALE: J,H
LINGUO- DENTALE: T,D,N
LINGUO-ALVEOLARE: S,Z



REABILITAREA FUNCTIEI ESTETICE LA EDENTATUL TOTAL PROTEZAT

SE MODELEAZA PROCESUL ALVEOLAR,
MODELAJUL ESTETIC AL PAPIELOR INTERDENTARE,
GROSIMEA MARGINILOR SI BAZEI VESTIBULARE A
PROTEZEI
ASPECTUL BUZELOR



REABILITAREA FUNCTIEI ESTETICE LA EDENTATUL TOTAL PROTEZAT

IMPORTANT

- LUNGIMEA BUZELOR
- TONICITATEA BUZELOR
- REALIZAREA EFECTULUI:
INCIZAL, FACIAL SI
CERVICAL
- CURBA SURASULUI
- GRADUL DE VIZIBILITATE
IN CULOARUL BUCAL
(CONVEX, CONCAV,
DREPT)



REABILITAREA FUNCTIEI ESTETICE LA EDENTATUL TOTAL PROTEZAT

IMPORTANT

FORMA ARCADEI
RAPORTUL INTERARCADIC FRONTAL






Pre-Op Dentures



Post-Op Dentures



Post-Op Dentures



Post-Op Dentures