

# TUMORILE ȚESUTULUI EPITELIAL

## Tumori benigne

### ➤ Papilomul

- urotelial (tranzitional)
- ductelor galactofore
- condiloamele acuminante.

### ➤ Adenomul

- \* adenomul vilos
- \* chistadenomul/adenomul chistic
- \* adenomul papilar/papilifer
- \* chistadenomul papilar/papilifer seros și mucinos
- \* fibroadenomul
- \* fibroleiomioadenomul
- \* adenomul pleomorf al glandelor salivare

## Tumori maligne

### ➤ Carcinomul

- bazocelular
- scuamos
- mixt
- urotelial (tranzitional).

### ➤ Adenocarcinomul

- chistadenocarcinomul
- adenocarcinomul papilar/papilifer
- carcinomul (adenocarcinomul) mucinos
- carcinomul schirogen
- carcinomul medular
- carcinomul cu celule clare
- carcinomul trabecular
- coriocarcinomul (corioepiteliomul).

## PAPILOMUL

- tumora benignă a epitelului multistratificat scuamos și a uroteliului
- excreșcență sesilă sau pediculată
- *Macroscopic*: suprafața netedă sau neregulată, rugoasă
- *Microscopic*: papilomul scuamos este constituit din axe conjunctivo-vasculare acoperite de epiteliu scuamos proliferat tumoral, mult ingrosat, cu stratificare regulată, fără anomalii celulare evidente.
- papiloame multiple = papilomatoză


# PAPILOMUL - MICROSCOPIE

Hiperkeratoza

Hipergranuloza


Acantoza

Hiperplazia  
stratului bazal




## PAPILOMUL UROTELIAL

- ❖ la nivelul căilor urinare (mai frecvent în vezica urinară);
- ❖ mase vegetante - axe conjunctivo-vasculare tapetate de uroteliu normal ca grosime.



# PAPILOMUL DUCTURILOR GALACTOFORE


- ❖ axe conjunctivo-vasculare + doua straturi de celule:
  - cubice sau cilindrice spre lumen
  - mioepiteliale spre stroma connjunctivă
- ❖ cauză de sângeărări mamelonare
- ❖ NU! risc ↑ pentru cancerul mamar



<http://alf3.urz.unibas.ch/pathopic/e/getpic-fra.cfm?id=3642>

# CONDILOAMELE ACUMINATE

- papiloame dezvoltate în regiunea ano-rectală
- infecție cu HPV



<http://alf3.urz.unibas.ch/pathopic/e/getpic-fra.cfm?id=000280>



[https://en.wikipedia.org/wiki/Genital\\_wart#/media/File:SOA-Condylomata-acuminata-around-anus.jpg](https://en.wikipedia.org/wiki/Genital_wart#/media/File:SOA-Condylomata-acuminata-around-anus.jpg)

- nuclei mari + halou perinuclear

# ADENOMUL

● Tumora benignă a epitelialui glandular și cilindro-cubic: poate fi întâlnit în glanda mamară, prostată, ficat, rinichi, glande endocrine, glande salivare și sebacee, în stomac, intestin etc.



<http://alf3.urz.unibas.ch/pathopic/e/getpic-fra.cfm?id=011209>

- in **organe parenchimatoase**: mase nodulare unice sau multiple, rotunjite, bine delimitate, incapsulate, de dimensiuni variabile.




<http://alf3.urz.unibas.ch/pathopic/e/getpic-fra.cfm?id=000508>



- pe **suprafata mucoaselor**: formațiuni polipoase, rotunjite sau ovalare, pediculate sau sesile.

## ADENOMUL FOLICULAR TIROIDIAN

- celule asemănătoare  
celor de origine:  
acini, trabecule, tubi  
sau foliculi + stroma  
conjunctivo-vasculară  
redusă




# ADENOMUL TUBULAR DE GLANDA MAMARĂ



<http://alf3.urz.unibas.ch/pathopic/e/getpic-fra.cfm?id=6329>


<http://alf3.urz.unibas.ch/pathopic/e/getpic-fra.cfm?id=6330>

# ADENOMUL VILOS (POLIPUL VILOS)



- colon sau rect
- numeroase arborizatii subțiri, delicate = axe conjunctivo-vasculare + epiteliu columnar mucosecretant; tumora aminteste de aspectul “frunzei de feriga”
- se poate maligniza.

# ADENOMUL VILOS




# CHISTADENOMUL (ADENOMUL CHISTIC)


## Chistadenom ovarian



# CHISTADENOMUL MUCINOS OVARIAN



# CHISTADENOMUL SEROS OVARIAN




# Chistadenom papilifer seros ovarian



# CHISTADENOMUL PAPILIFER

**Chistadenom papilifer mucinos ovarian**



<http://alf3.urz.unibas.ch/pathopic/e/getpic-fra.cfm?id=000154>

*malignizare posibilă.*

# FIBROADENOMUL

Tumoră benignă frecventă a *glandei mamare*.

## Macroscopic:

- nodul/i ferm/i
- albicios-sidefiu
- bine delimitat
- încapsulat
- mobil față de țesuturile din jur.




<http://alf3.urz.unibas.ch/pathopic/e/getpic-fra.cfm?id=002835>

# FIBROADENOMUL

## Microscopic:


Tesutul conjunctiv proliferat se dispune:

>în jurul structurilor glandulare care își păstrează forma  
**(fibroadenom pericanicular).**




# FIBROADENOMUL

> țesutul conjunctiv proliferează mai intens → tubii glandulari sunt comprimați → “coarne de cerb” (**fibroadenomul intracanalicular**).



# • ADENOMUL PLEOMORF DE GLANDĂ SALIVARĂ


Tumora mixta a glandelor salivare



## ADENOMUL PLEOMORF DE GLANDĂ SALIVARĂ


### Microscopic:

- **componentă epitelială:** insule + trabecule de celule poligonale/ rotunjite, mici structuri glandulare;
- **componentă mezenchimală:** ţesut conjunctiv cu zone de transformare hialină, mixoidă, condroidă, osteoidă




# FIBROLEIOMIOADENOMUL DE PROSTATĂ

- proliferarea glandelor + elementelor conjunctive și musculare netede stromale




[https://en.wikipedia.org/wiki/Benign\\_prostatic\\_hyperplasia#/media/File:Nodular\\_hyperplasia\\_of\\_the\\_prostate.jpg](https://en.wikipedia.org/wiki/Benign_prostatic_hyperplasia#/media/File:Nodular_hyperplasia_of_the_prostate.jpg)



<http://alf3.urz.unibas.ch/pathopic/e/getpic-fra.cfm?id=008700>

# TUMORI MALIGNE



Tumora maligna a epitelului: pavimentos stratificat si urotoeliului

## Adenocarcinomul

Tumora maligna a epitelului glandular.

## Coriocarcinomul


Tumora maligna a placentei.

- Chistadenocarcinomul
- Adk. papilar sau papilifer
- Adk. mucosecretant
- Adk. medular
- Adk. cu celule clare
- Adk. schirogen
- Adk. medular
- Adk. trabecular

# CARCINOMUL BAZOCÉLULAR

Macroscopic:


- nodul care se ulcerează + crustă (**ulcus rodens**);
- frecvent pe față.
- malignitate redusă, rămâne mult timp localizat;
- curabil prin excizie chirurgicală adecvată;
- radiosensibil;
- risc de recidivă locală;
- excepțional da metastaze.




# CARCINOMUL BAZOCELULAR

Microscopic:

- lobuli, plaje, insule, cordoane de celule cu nuclei ovalari, bogați în cromatină, inegali, citoplasma puțină, bazofilă, mitoze frecvente;
- celulele ~ celor din stratul basal al epidermului;
- palisadarea celulelor la periferia lobulilor;
- retracții artefactuale ale stromei;



## CARCINOMUL BAZOCELULAR



# CARCINOMUL SCUAMOS

**Carcinomul scuamos  
(scuamocellular/epidermoid  
/spinocelular)**

Cheratinizat  
Necheratinizat



[https://en.wikipedia.org/wiki/Squamous-cell\\_carcinoma#/media/File:Squamous\\_Cell\\_Carcinoma.jpg](https://en.wikipedia.org/wiki/Squamous-cell_carcinoma#/media/File:Squamous_Cell_Carcinoma.jpg)


- tegumente
- mucoase acoperite de epiteliu scuamos stratificat (buze, limba, faringe, esofag, col uterin, vagin, anus)
- +/- epitelii glandulare **metaplaziate scuamos**.

Carcinoamele scuamoase cheratinizate

- tumori radiorezistente
- metastaze precoce limfo-hematogene.

# CARCINOMUL SCUAMOS KERATINIZAT

- plaje, lobuli, cordoane de celule tumorale ~ celulele stratului spinos al epidermului.
- lobuli, plaje, cordoane de celule poliedrice, citoplasma eozinofila, nuclei pleomorfi, mitoze atipice;
- cheratinizare → perle epiteliale keratozice și parakeratozice;
- nr. crescut de perle → **cancroid**.




# ALTE CARCINOAME

## Carcinomul scuamos necheratinizat:

- fara tendinta la cheratinizare / formare de perle de cheratină;
- grad înalt de malignitate;
- prognostic sever.

Carcinom scuamos necheratinizat





## Carcinomul mixt, spino-bazocelular:

aspect de carcinom scuamos cheratinizat plus carcinoma bazocelular

# CARCINOMUL UROTELIAL

- ❖ se dezvolta din uroteriul vezicii urinare, bazinetului, ureterelor, uretrei;
- ❖ proliferari papilifere cu axe conjunctivo-vasculare foarte ramificate;
- ❖ celule stratificate, cu pleomorfism nuclear.



<http://alf3.urz.unibas.ch/pathopic/e/getpic-fra.cfm?id=008197>

<http://alf3.urz.unibas.ch/pathopic/e/getpic-fra.cfm?id=006542>


# ADENOCARCINOMUL

❖ tumorile maligne ale ţesutului epitelial glandular (cu punct de plecare epiteliale glandulare și cilindro-cubice).

❖ Localizare: intestinul gros, stomac, glandă mamară, endometru, pancreas, căi biliare, bronșii etc.

## Macroscopic:

- în organele parenchimatoase:
- mase nodulare neregulate + prelungiri care infiltrează structurile din jur;
- aspect chistic, +/- excrescențe, vegetații papilifere pe suprafața internă sau externă.



<http://alf3.urz.unibas.ch/pathopic/e/getpic-fra.cfm?id=008760>




<http://alf3.urz.unibas.ch/pathopic/e/getpic-fra.cfm?id=009145>

# ADENOCARCINOMUL

## Macroscopic:


- pe suprafața mucoaselor:
- vegetant – polipoid
- infiltrativ difuz în suprafață (placă)
- infiltrativ în profunzime
- +/- ulcerare → cratere neregulate.



# ADENOCARCINOMUL

## Microscopic:


- celulele maligne → **pseudoglande**, tubi de diferite forme si marimi;
- celule tumorale dispuse pe unul sau mai multe randuri, **pleomorfism nuclear** si **mitoze atipice**;
- stroma tumorii = ţesut conjunctiv sau muscular.



# ADENOCARCINOAME

## CHISTADENOCARCINOMUL


- ovar;
- pseudoglande dilatate chistic
- celule tumorale cilindrice, cubice sau turtite.




# ADENOCARCINOAME

## ADENOCARCINOMUL PAPILIFER (PAPILAR)

- tiroidă, ovar, intestin gros, endometru;
- celulele neoplazice epiteliale → papile.




Carcinom papilar tiroidian




# ADENOCARCINOAME

## ADENOCARCINOMUL MUCOSECRETANT



- celulele tumorale secretă mucus (mucina):
  - intracelular → celule tumorale în “inel cu pecete”
  - în lumenul glandelor neoformate
  - extracelular (carcinomul coloid).



# Carcinom coloid și carcinom cu celule în “inel cu pecete”



<http://alf3.urz.unibas.ch/pathopic/e/getpic-fra.cfm?id=3869>




<http://alf3.urz.unibas.ch/pathopic/e/getpic-fra.cfm?id=001333>

<http://alf3.urz.unibas.ch/pathopic/e/getpic-fra.cfm?id=10542>


# ADENOCARCINOAME

## CARCINOMUL SCHIROGEN

- glanda mamară; mai rar stomac;
- consistență fermă, lemoasă, antrenează retracții locale accentuate;
- stromă conjunctivo-hialină ↑;
- + grupuri mici de celule neoplazice.



<http://alf3.urz.unibas.ch/pathopic/e/getpic-fra.cfm?id=004221>




<http://alf3.urz.unibas.ch/pathopic/e/getpic-fra.cfm?id=005599>


# ADENOCARCINOAME

## CARCINOMUL MEDULAR

- tumoră moale, creștere relativ rapidă, tendință la necroză și ulceratie;
- glanda mamară;
- câmpuri extinse de celule maligne + stroma conjunctivo-vasculară redusă, infiltrată cu limfocite.



<http://alf3.urz.unibas.ch/pathopic/e/getpic-fra.cfm?id=010071>




<http://alf3.urz.unibas.ch/pathopic/e/getpic-fra.cfm?id=010071>


# ADENOCARCINOAME

## CARCINOMUL CU CELULE CLARE

- celule poliedrice/rotunjite, cu citoplasma clară sau fin granulară, bogată în lipide și glicogen;
- rinichi.



<http://alf3.urz.unibas.ch/pathopic/e/getpic-fra.cfm?id=004890>




<http://alf3.urz.unibas.ch/pathopic/e/getpic-fra.cfm?id=004892>

<http://alf3.urz.unibas.ch/pathopic/e/getpic-fra.cfm?id=004890>

# ADENOCARCINOAME

## CARCINOMUL TRABECULAR

- **ficit;**
- celulele neoplazice se dispun sub formă de trabecule.




[http://alf3.urz.unibas.ch/pathopic/e/p-thu.cfm?&FallID=1212&vm=P&SrowSave=51&Nrow=10&srchTopoG=0&srchTopo=185&srchDG=8&srchH  
erkunft=0&srchFaerbung=0&srchMagni=0&srchSerie=0&srchAutor=0&srchDescShort=carcinoma&srchBiop  
sie=&srchID=&srchSex=-1&srchProbenArt=0&srchIH=0](http://alf3.urz.unibas.ch/pathopic/e/p-thu.cfm?&FallID=1212&vm=P&SrowSave=51&Nrow=10&srchTopoG=0&srchTopo=185&srchDG=8&srchHerkunft=0&srchFaerbung=0&srchMagni=0&srchSerie=0&srchAutor=0&srchDescShort=carcinoma&srchBiopsie=&srchID=&srchSex=-1&srchProbenArt=0&srchIH=0)

# CORIOCARCINOMUL (CORIOEPITELIOMUL)

<http://alf3.urz.unibas.ch/pathopic/e/p-thu.cfm?&FallID=3015&vm=P&SrowSave=1&Nrow=10&srchTopoG=0&srchTopo=0&srchDG=8&srchHerkunft=0&srchFaerbung=0&srchMagni=0&srchSerie=0&srchAutor=0&srchDescShort=choriocarcinoma&srchBiopsie=&srchID=&srchSex=1&srchProbenArt=0&srchIH=0>

- tumora malignă a placentei;
- pleomorfism celular foarte exprimat;
- activitate mitotica bogată;
- zone extinse de necroza și hemoragie.



## TUMORILE ȚESUTURILOR MOI (TUMORI MEZENCHIMALE)

- ❖ Dezvoltate din țesuturile mezodermale extrascheletale - mușchii scheletali, țesutul adipos, țesutul fibros, vasele sanguine și limfatice + nervi periferici.
- ❖ Tumorile maligne ale țesuturilor moi (**sarcoame**) – rar întâlnite < 1% din toate cancerele.
- ❖ Tumorile benigne - de 100 x mai frecvente decât variantele maligne.
- ❖ Sarcoamele metastazează pe cale hematogenă - frecvent în plămân; deces prin boala metastatică, nu prin invazie locală.

# **TUMORILE ȘI LEZIUNILE PSEUDOTUMORALE DEZVOLTATE DIN ȚESUTUL CONJUNCTIV COMUN**

## **Tumori benigne și lezioni pseudotumorale**

- **Dermatofibromul  
(histiocitomul fibros  
benign);**
- **Fibromatoza**

## **Tumori maligne**

- **Fibrosarcomul**
- **Sarcomul pleomorf  
nediferențiat (histiocitomul  
fibros malign).**

# DERMATOFIBROMUL (HISTIOCITOM FIBROS BENIGN)

= Tumora benignă a fibroblastelor.

Localizare: frecvent la nivelul extremităților;

Macroscopic:

- formațiune nodulară proeminentă pe suprafața tegumentului;
- margini slab conturate;
- consistență crescută;
- dimensiuni →rar depasind 0,5 cm Ø.





[https://en.wikipedia.org/wiki/Benign\\_fibrous\\_histiocytoma](https://en.wikipedia.org/wiki/Benign_fibrous_histiocytoma)

# DERMATOFIBROMUL (HISTIOCITOM FIBROS BENIGN)

<http://alf3.urz.unibas.ch/pathopic/e/getpic-fra.cfm?id=004255>

Microscopic:

- în dermul papilar și reticular: fibroblaste cu dispoziție în vârtejuri,
- slaba demarcare față de țesuturile din jur;
- epidermul: hiperplaziat + hiperpigmentat melanic.




<http://alf3.urz.unibas.ch/pathopic/e/getpic-fra.cfm?id=007743>

# FIBROSARCOMUL

- = Tumora malignă a fibroblastelor.
- la nivelul coapsei din: fascii, țesuturi cicatriciale, periost, tendoane;
- apare la toate varstele (inclusiv forme congenitale); mai frecvent la adulți.

Macroscopic:

- tumora slab delimitată + zone de necroză, hemoragie.




<http://alf3.urz.unibas.ch/pathopic/e/getpic-fra.cfm?id=009243>


# FIBROSARCOMUL

Microscopic:

- fascicole dens celulare de fibroblaste maligne, intersectate “în os de pește“;
- ❖ prognostic - rezervat, supraviețuirea la 5 ani → 40%.



<http://alf3.urz.unibas.ch/pathopic/e/p-thu.cfm?&FallID=4902&vm=P&SrowSave=11&Nrow=10&srchTopoG=0&srchTopo=0&srchDG=8&srchHerkunft=0&srchFaerbung=0&srchMagni=0&srchSerie=0&srchAutor=0&srchDescShort=fibrosarcoma&srchBiopsie=&srchID=&srchSex=1&srchProbenArt=0&srchIH=0>



<http://alf3.urz.unibas.ch/pathopic/e/getpic-fra.cfm?id=006072>


# SARCOMUL PLEOMORF NEDIFERENȚIAT (HISTIOCITOMUL FIBROS MALIGN)

- cea mai comună tumoră malignă a ţesutului conjunctiv;
- apare la pacienți > 40 ani;
- **localizare**: fascii profunde, mușchii scheletici ai membrelor inferioare;
- în legătură cu cicatrici postoperatorii, corpi străini sau radioterapie în antecedente.

# SARCOMUL PLEOMORF NEDIFERENȚIAT (HISTIOCITOMUL FIBROS MALIGN)

## Macroscopic


- tumoră neîncapsulată, gri-albicioasă sau gălbuie, cu zone de necroză și hemoragie.



<http://alf3.urz.unibas.ch/pathopic/e/getpic-fra.cfm?id=008926>

# SARCOMUL PLEOMORF NEDIFERENȚIAT (HISTIOCITOMUL FIBROS MALIGN)

- fascicole de celule fuziforme + celule pleomorfe, bizarre ;
- ocazional celule asemănătoare histiocitelor;
- activitate mitotică exprimată + zone de necroză tumorală.



## SARCOMUL PLEOMORF NEDIFERENȚIAT (HISTIOCITOMUL FIBROS MALIGN)

PROGNOSTICUL PACIENTILOR DEPINDE DE:

- GRADUL ATIPIEI CELULARE;
- DE NUMĂRUL MITOZELOR ATIPICE;
- DE PREZENȚA ZONELOR DE NECROZĂ.

> 50% DINTRE PACIENTI → RECIDIVE TUMORALE;

DECES PRIN METASTAZE (PULMONARE MAI FREVENT).

SUPRAVIEȚUIREA LA 5 ANI: 50% → 60%.

# TUMORILE ȚESUTULUI ADIPOS

## Tumori benigne

- Lipomul
- Hibernomul

## Tumori maligne

- Liposarcomul

# LIPOMUL

## Localizare:

- tesut subcutanat (spate, umeri, gât, coapse);
- retroperitoneal, perirenal;
- în mușchii scheletici, ai orbitei.

## Macroscopic:

- unic / multiplu;
- aspect rotunjit, nodular sau multilobulat;
- bine delimitat +/- prelungiri  
→ exereză incompletă;
- culoare galbenă.





<http://alf3.urz.unibas.ch/pathopic/e/getpic-fra.cfm?id=004426>

# LIPOMUL

Microscopic:

- lobuli de celule adipoase
- nuclei mici, periferici;
- septuri conjunctive subțiri,
- slab vascularizate.



<http://alf3.urz.unibas.ch/pathopic/e/getpic-fra.cfm?id=9533>

# LIPOMUL

Forme combinate:

- fibrolipom
- mixolipom
- angioligom

Angiolipom

