



# Prezentare de Caz

Asist. Univ. Dr. Bogdan Miutescu  
Clinica de Gastroenterologie si Hepatologie

# Motivele Internarii

- Barbat, 70 ani din mediul rural este adus in UPU SCJUT cu:
  - Durere epigastica
  - Melena si hematemeza
  - Starea generala influentata
- APP- HTA esentiala, Guta, DZ tip II tratat cu ADO

# Examen Clinic

- Tegumente reci, transpirate, T- 36.8
- Abdomen moale, mobil cu respiratia, dureros spontan si la palpare la nivelul epigastrului. TI prezent, TR+ pentru melena.
- Aparat CV- tahicardie, AV- 100 bpm, TA- 100/70 mmHg, fara suflu supra adaugate
- Auscultatoric: tahipnee, fara raluri

# Analize de sange


- Hemoleucograma: H = 3.78 mil/mmc, Hb = 6.5 g/dl, Ht = 42.6 %, L = 6000/mmc (N = 89.8 %, Tr = 235000/mmc);
- Biochimie: lipaza serica = 37 U/l,, uree = 90 mg%, creatinina = 1.12 mg%, ASAT = 15 U/l, ALAT = 20 U/l, GGTP= 23-U/l, FA=40 U/l, BT = 0.9 mg%, INR= 1.3, VSH= 25mm/h; Fibrinogen= 12 mg/dl; CRP= 8.72 mg/l;
- ionograma serica: Na = 142 mmol/l, K = 3.5 mmol/l;

# Examen Paraclinic

- EKG- tahicardie sinusala, fara semne de ischemie acuta.
- Rx abdomen pe gol/torace- in limite normale
- Ecografie abdominala: in limite normale, fara staza gastrica.
- Gastroscoapie:

- Stomac:

**Gastric ulcer with an adherent clot**





**Visible vessel within  
the ulcer base**

# Diagnostiche Evocate

- Hemoragie digestiva superioara exteriorizata prin hematemeza si melena
- Ulcer gastric Forrest IIa
- Hipertensiune arteriala esentiala gradul II cu risc CV foarte inalt
- Guta
- Diabet zaharat tip II tratat cu ADO



# Dg. Diferentiale ale Ulcerului Gastric

- Durerile abdominale acute de la nivelul etajului abdominal superior:
  - Infarctul miocardic acut inferior (EKG+ Enzime miocardice)
  - Pancreatita acuta (lipaza normala)
  - Colica biliara/ renala (nu are litiaza)
  - Angiocolita Acuta (nu are icter obstructiv)
  - Apendicita Acuta ( nu are aparare musculara)
  - Ischemie mezenterica (nu este cunoscut cu arteriopatie/ FiA)
  - Pneumopatie bazala (Rx Torace -)
  - Anevrism disecant de Ao (Eco - )

# Dg. Diferentiale ale Hemoragiei digestive superioare

- Dg Diferential al etiologiei HDS

- Esofagian

- Leziuni Mallory-Weiss
    - Esofagita
    - Varice esofagiene
    - Neoplasm esofagian
    - Fistula aorto-esofagiana
    - Fistula pneumo-esofagiana
    - Ulcer esofagian
    - Ectazii vasculare

- Dg Diferential al etiologiei HDS

- Stomac

- Neoplasm gastric
    - GIST
    - Leziune Dieulafoy
    - Varice gastrice
    - Gastropatie portal hipertensiva
    - Boala Crohn


- Dg Diferential al etiologiei HDS
  - Bulb, Duoden
    - Ulcer bulbar/duodenal
    - Leziune Dieulafoy
    - Fistula vasculara
    - Neoplasm pancreatic/colangiocarcinom cu invazie duodenala

# Complicatii

- hemoragie → soc hemoragic → deces
- Ulcer → perforatie → peritonita

# Tratament

- Reechilibrare hidroelectrolitica
- Corectarea anemiei: 2U CER
- Stabilizare hemodinamica
- Endoscopie digestiva superioara



# Tratament

## Medicamentos:

- Esomeprazol inj. 2 fl 40 mg in bolus, apoi in pev cont. 8mg/h timp de 72h, apoi cu Esomeprazol 40 mg 1cp/zi timp de 8 saptamani.
- Regim Igieno-dietetic:
  - In primele 24h nu se alimenteaza, apoi alimentatie semisolida, dupa 72h regim de protectie gastrica.
  - Intreruperea consumului de AINS



# Tratament

- Determinare Atc anti Helicobacter-Pylori si administrea curei de eradicare:
  - - Esomeprazol cp 40 mg, 2x1 cp/zi
  - - Levofloxacin cp 500 mg, 2x1cp/zi
  - - Amoxicilina cp 1000 mg, 2x1cp/zi
- Sau
- Esomeprazol cp 40 mg, 2x1 cp/zi
  - Subcitrat de Bi 120 mg 4x1cp/zi
  - Metronidazol 500 mg 3x1cp/zi
  - Tetraciclina cp 500 mg 3x1 cp/zi

# Tratament -follow-up

- Reevaluare endoscopica peste 2 luni +/- biopsie.
- Determinarea Atg fecal HP peste 4 saptamani dupa terminarea terapiei cu Esomeprazol
- Monitorizare HB si sideremie.

# Particularitatea cazului

- Pacient cu hemoragie digestiva superioara secundara unui ulcer care a necesitat terapie endoscopica
- Ulcer cu cheag aderent care a fost indepartat pentru a se putea aplica terapia endoscopica.