



# Clasificarea durerii

## Boeriu E 2019

# Durerea – *definiție*

**Durerea** este o experiență senzorială și emoțională neplăcută asociată cu o leziune tisulară actuală sau potențială, sau descrisă în termenii unei asemenea leziuni.

International Association for Study of Pain

# Durerea- criterii de clasificare

1. Criteriu temporal

2. În funcție de  
intensitate/severitate

3. În funcție de mecanismul  
fiziopatologic

4. În funcție de localizare

5. În funcție de circumstanțele de  
apariție

# 1. Durerea – *criteriu temporal*

## Durere acută

- asociată cu o leziune tisulară acută, traumatică sau sec unei boli /cu o disfuncție a musculaturii sau a organelor interne care nu produce leziune (ex.spasm muscular)
- rezultatul stimulării nociceptorilor periferici somatici sau viscerali

## Durere cronică

- durere care persistă **mai mult de o lună** după vindecarea unei afecțiuni algogene acute/
- durerea produsă de o **afecțiune cronică**
- prin evoluția ei produce **stimularea permanentă a nociceptorilor**/sau
- repetarea timp de **luni sau ani a aceleiași dureri**

# 1. Durere- *criteriu temporal*, *durere acută vs durere cronică*

## Durere acută

- ▶ **Durează de obicei atât cât durează afecțiunea** care a provocat-o, sau cu ceva mai mult (**zile sau săptămâni**).
- ▶ Comportamentul bolnavului este caracteristic:
- ▶ agitație/
- ▶ imobilitate,
- ▶ **semne de stimularea SNV simpatic**

## Durere cronică

- ▶ **Nu are nicio funcție biologică**, dimpotrivă, cu cât durează mai mult devine o **forță distructivă tot mai puternică care erodează permanent** biologicul, afectul, mentalul, mediul social și economic al bolnavului.
- ▶ **Comportament specific:**
  - ✓ Uneori este **mascată** intensitatea durerii
  - ✓ Preocuparea **exagerată** de boală
  - ✓ **Descrierea simptomatologiei** dureroase
  - ✓ Discuții pe teme medicale
  - ✓ Frecventarea repetată a serviciilor medicale
  - ✓ **Mersul cu dificultate,**
  - ✓ **geamătul,**
  - ✓ **preferința pentru ședere sau clinostatism,**
  - ✓ **somn perturbat,**
  - ✓ **modificări de personalitate.**


# 1. Durerea – *criteriu temporal*, *durerea neoplazică*

- **Durerea cr. neoplazică** are un mecanism patogenetic oarecum diferit de cel responsabil pentru apariția durerii cronice din alte afecțiuni :
- ✓ distrucție tisulară **continuă și progresivă**,
  - ✓ durerea poate fi considerată ca o **durere acută produsă continuu**, de lungă durată
  - ✓ Caracteristica acestei boli este **invadarea treptată în “pată de ulei”** a structurilor de vecinătate și producerea metastazelor la distanță  
→ antrenarea în producerea durerii a mai multe mecanisme etio-patogenetice, adeseori a 3 sau 4 → dureri concomitente cu localizări, intensități și caractere diferite.

## 2. Durerea – în funcție de intensitate

**Scala analog vizuală (VAS)** rămâne **cel mai frecvent** utilizată în practica clinică și permite clasificarea durerii în :

- **durere ușoară** VAS <4
- **durere moderată** VAS 4-6
- **durere severă** VAS mai mare sau egală cu 7



### 3. Durerea – *în funcție de mecanismul fiziopatologic*

#### Durere nociceptivă

- Prin stimularea nociceptorilor periferici (somatici, viscerali)

#### Durere neuropatică

- Prin afectarea căilor de conducere (periferice sau centrale)



### 3. Durerea – *în funcție de mecanismul fiziopatologic,* *durerea nociceptivă*

## Durere nociceptivă

Durere locală,  
superficială sau  
profundă de  
intensitate variabilă  
în funcție de cauză

**Nu** se însoțește de  
manifestări  
neurologice

Tratament:  
AINS  
OPIOIDE  
ADJUVANT

### 3. Durerea – în funcție de mecanismul fiziopatologic, *durerea neuropatică*

#### Leziune incompletă de structuri nervoase periferice

- disestezie continuă
- alodinie
- cauzalgie
- parestezie
- +/-durere lancingantă intermitent
- +/-modificări neurol. (motorii, senzitive, vegetative)
- localizare în teritoriul de inervație al nervului (de obicei radiculară)
- localizare în membre, predominant distal, cu progresie proximală
- *Tratament*
- ANTIEPILEPTICE
- ANTIDEPRESIVE
- ANTIARITMICE
- +/-OPIACEE
- AINS/AIS/ALT ADJUVANT

#### Leziune completă de structuri nervoase periferice

- durere sub formă de arsură cu pusee lancingante
- hiperalgezie
- +/-accentuare la emotii (eliberare de NA )
- tulb neurologice vegetative
- durere continuă de membru fantomă cu crt de arsură
- *Tratament*
- INFILTRAȚII CU ANESTEZIC LOCAL
- ANTIARITMICE
- ANTIEPILEPTICE
- ANTIDEPRESIVE
- TENS
- PSIHOTERAPIE

#### Leziuni de structuri nervoase centrale

- **LEZIUNE MEDULARĂ ANTERO-LATERALĂ**
- ✓durere disestezica segmentara (in centura ) la nivelul leziunii medulare
- ✓durere difuza sub leziune
- ✓deficit neurologic senzitiv (intotdeauna ), motor , vegetativ
- ✓+/-durere nociceptiveAIS
- **LEZIUNE INTRACEREBRALĂ**
- ✓durere de tip cauzalgic/disestezic
- ✓tulburari neurologice senzitive, motorii , vegetative
- Tratament*
- ✓ANTIEPILEPTICE
- ✓ANTIDEPRESIVE
- ✓BARBITAL
- ✓AIS
- ✓AINS +OPIOD

#### Durere neuropată postherpetică

- durere continuă – arsură
- episoade de durere lancingantă în teritoriul n.afectat
- *Tratament*
- ANTIEPILEPTICE
- ANTIDEPRESIVE
- ANTIVIRALE
- +/-AINS

## 4. Durerea – *în funcție de localizare*

### Durere locală

- Crt durerii produse în structurile somatice superficiale
- poate fi însoțită de
- hiperalgezie,
- hiperestezie,
- durere profundă provocată în teritoriul respectiv

### Durere iradiată

- Durere percepută de-a-lungul unui nerv

### Durere referită

- apare **în teritoriul somatic profund și în viscere** și e descrisă ca fiind **localizată la suprafața corpului**, în teritoriul de inervație al segmentului medular corespunzător atât viscerului cât și tegumentului
- +/-hiperalgezie,
- hiperestezie,
- durere profundă provocată,
- spasm muscular,
- tulb vegetative (reducerea forței musculare, a motricității sau a reflectivității)

## 5. Durerea – *în funcție de circumstanțele de apariție*

### Durere continuă

### Durere incidentă

- episoade **intermitente** de durere moderată sau severă
- survenite pe un **fond de durere controlată**
- **cu debut brusc și o cauză identificabilă**

### Durere pre-doză

- durere care apare cu un anumit timp **înainte de adm următoarei doze de analgetic**=doză zilnică insuficientă de analgetic /
- timp prea lung între adm

### Puseu dureros

- “BREAKTHROUGH PAIN “
- durere care apare la pacienți cu tratament antialgic adecvat, **fără o cauză bine stabilită**

# Concluzii

- ▶ **Există multiple criterii de clasificare a durerii: temporal , mecanism de producere, localizare, circumstanțe de apariție, severitate**
- ▶ **Cunoașterea caracteristicilor diferitelor tipuri permite orientarea adecvată a tratamentului**