

CAZ CLINIC 1

- Pacientă în vârstă de 38 ani se internează în clinica medicală prin transfer de la Clinica de Pneumologie, unde a fost exclus diagnosticul de pneumonie tuberculoasă.
- Antecedente heredo-colaterale: neagă
- Antecedente personale: neagă
- Condiții de viață și muncă: nefumătoare, consum zilnic de cafea, neagă consumul de alcool,
- Obiectiv: T 38,5°C, tip constituțional normostenic, erupție eritematoasă localizată la nivelul frunții, eminențelor malare, bărbiei, decolteului, țesut celular subcutanat normal reprezentat, edeme gambiere care păstrează godeu, fără semne obiective de artrită, sistem muscular normoton, normotrof, cu forță musculară păstrată, sistem ganglionar periferic nepalpabil, raluri crepitante diseminate pe ambele arii pulmonare, TA 110/80 mmHg, FC 90 b/min, puls periferic prezent, fără sufluri cardiace.



Explorări paraclinice

- Hemoleucogramă: Hb 10,1 g/dl, Ht 31,4%, Leucocite 2440/mmc, Limfocite 450/mmc, Trombocite 115000/mmc
- Frotiu periferic: normocitoză, normocromie
- Test Coombs: negativ
- Sindrom inflamator biologic: VSH 100 mm/h, Proteina C reactivă 2 mg/dl, Fibrinogen 947 mg/dl


Explorări biochimice: Uree 16 mg/dl, Creatinină 0,7 mg/dl, Acid uric 3,5 mg/dl, Colesterol 385 mg/dl, Trigliceride 278 mg/dl, Proteine totale 5,12 g/dl, Albumine serice 2,8 g/dl, fără alte modificări biochimice

- Clearance cu creatinină 91,26 ml/min
- Examen de urină: D 1030, pH 6, Proteinurie 300 mg/dl, Glicozurie, Corpi cetonici, Nitriți absenți, Urobilinogen normal, Sediment: rare epitelii plate, 0-2 L/câmp, 0-1 H/câmp
- Sediment Addis: 7500 H/minut, 2000 L/minut
- Testul dismorfismului eritrocitar: pozitiv
- Proteinurie: 4500 mg/24 ore, Proteinurie/creatinină urinară 4892 mg/g
- Urocultură (3 probe): steril

- Explorări imunologice:

- Factor reumatoid: negativ
- Anticorpi antinucleari: **pozitivi (1/640)**
- Profil anticorpi antinucleari: **anti ADN dublu catenar pozitiv (1/320)**
- C3: **52** mg/dl (90-180)
- C4: **0,05** g/l (0,1-0,4)
- Anticoagulant lupic: negativ,
- Anticorpi antifosfolipidici (IgM, IgG): negativ

- Radiografie torace: opacități miliare, dispuse în 2/3 inferioare ale ambilor plămâni, cord de aspect radiologic normal



- Restul investigațiilor paraclinice: în limite normale
- Examenul histopatologic renal nu a fost efectuat (refuzul pacientei)

- Diagnostic:

Lupus eritematos sistemic cu afectare cutanată, hematologică (Anemie normocromă, normocitară; Leucopenie; Limfopenie; Trombocitopenie), pulmonară (Pneumonită lupică), renală (Glomerulonefrită lupică; Sindrom nefrotic secundar impur; Boală cronică de rinichi stadiul G1, RFG 91,26 ml/min) (SLEDAI 17). Dislipidemie secundară formă severă

- Tratament: corticoterapie (pulsterapie cu Metilprednisolon i.v., continuată cu Prednison p.o.) + Ciclofosamidă (pulsterapie lunară i.v.) + Plaquenil; asociat: Sortis, Ca + D3, Nexium